



Marzyo

MARZYO

FERTILIZZANTE CE

PEC 7: AMMENDANTE ORGANICO E AMMENDANTE INORGANICO

Benefici

- ✓ Aumenta il contenuto di sostanza organica
- ✓ Elevato apporto di acidi umici che facilitano la mobilità e l'assorbimento degli elementi minerali
- ✓ Ripristina e migliora le caratteristiche di fertilità, struttura e qualità del suolo
- ✓ Migliora la gestione e la disponibilità dell'acqua nel suolo

Caratteristiche

MARZYO è una miscela fisica di fertilizzanti formulato a partire dall'unione di letame avicolo trasformato proveniente da allevamenti non industriali e basalto micronizzato. La sua formulazione lo rende adatto a qualsiasi tipologia di terreno. **MARZYO** aumenta il contenuto di sostanza organica, grazie alla presenza di letame avicolo, che favorisce la cessione graduale e prolungata degli elementi nutritivi migliorando la fertilità anche a medio-lungo termine.

MARZYO ha la funzione di mantenere, migliorare e proteggere le proprietà fisico-chimiche e l'attività biologica del suolo. La Farina di Basalto® migliora la struttura del terreno, la sua porosità e garantisce una migliore gestione e disponibilità dell'acqua. Consentendo la ritenzione idrica nei periodi di siccità e aumentando la capacità drenante nei periodi piovosi. **MARZYO** apporta una elevata concentrazione di acidi umici essenziali per la fertilità del suolo, per favorire la mobilità e l'assorbimento degli elementi minerali e per evitare il loro dilavamento.

Composizione

Tenore in materia secca	85,8 % sulla massa
pH	7,34
Conducibilità elettrica	<100 mS/m
Carbonio organico (C org)	22 % sulla massa
Azoto organico (N org)	1,64 % sulla massa (stallatico avicolo trasformato)
C org/N	11
Azoto (N)	1,8 % sulla massa

Anidride fosforica (P ₂ O ₅)	1,58 %
Ossido di Potassio (K ₂ O) totale	3 %
Farina di Basalto®	macro e micro-elementi minerali (per dettagli consultare la scheda tecnica specifica)

Dosi e modalità di utilizzo

Colture	Epoca e modalità d'impiego	Dose Kg/ha
Orticoltura	Pre-trapianto, localizzata	500 - 1000 Kg/ha
Frutticoltura	Post-raccolta / Ripresa vegetativa, sotto-chioma	400 - 600 Kg/ha (1Kg/pianta)
Viticoltura	Post-raccolta / Ripresa vegetativa, localizzata, sotto-chioma	500 - 800 Kg/ha
Seminativi	Pre-semina	500 - 800 Kg/ha
Per altri usi si consiglia		100 g / m ²

Distribuzione uniforme al suolo interrando il prodotto con un leggera lavorazione, quale un'erpatura. Si consiglia il suo utilizzo in autunno e in primavera. Grazie alla sua pellettizzazione si distribuisce con facilità impiegando i comuni spandiconcime. Queste dosi hanno valore puramente indicativo e possono variare in funzione alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona. Per informazioni più specifiche contattare il servizio tecnico aziendale.

Precauzioni

Obbligatorio uso di mascherina antipolvere e occhiali protettivi. In caso di ingestione lavare la bocca con molta acqua, non indurre vomito. In caso di sintomi consultare il medico.

 **PRODOTTO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA**

 **APPLICAZIONE AL SUOLO**
Formulato: pellet: diam. 3 - 4 mm - lung. 2-3 cm

 **CONFEZIONI: 20 Kg - Big Bag fino a 1000 Kg**

Avvertenze

Conservare il prodotto in luogo asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e/o luce diretta, umidità ed acqua. Attenersi alle informazioni riportate nella scheda informativa e nell'etichetta. Questo fertilizzante contiene stallatico trasformato che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adeguate misure correttive.